Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје, Република Северна Македонија
Македонско медицинско електронско списание. 2025 Ное 20; 5:45-46.
https://doi.org/10.3889/mmej.2025.6593
eISSN: 1857-9809
Категорија: *МИТ-ФДМ2025 - „МЕЃУ ПРАКСАТА И НАУКАТА “*
Секција: *Стоматологија*



OPEN ACCESS

Орални преканцерози – чекори во амбулантски услови

Мирјана Поповска[1,2*]

[1]Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“, Скопје, Северна Македонија; [2]Факултет за дентална медицина, МИТ Универзитет, Скопје, Северна Македонија

Уредено: Славица Христоманова-Митковска
Цитирање: Поповска М. Орални преканцерози – чекори во амбулантски услови. Макед Мед Електр С. 2025 Ное 20;5: 45-46. https://doi.org/10.3889/mmej.2025.6593
Клучни зборови: еритроплакија, леукоплакија, орални лезии.
***Кореспонденција:** Мирјана Поповска, Универзитетски стоматолошки клинички центар „Св. Пантелејмон“, Скопје, Северна Македонија; Факултет за дентална медицина, МИТ Универзитет, Скопје, Северна Македонија.
E-mail: popovskam2002@yahoo.com
Примено: 01-Окт-2025
Ревидирано: 10-Ное-2025
Прифатено: 14-Ное-2025
Печатарски права: © 2025 Мирјана Поповска.
Лиценца: Овој труд е со отворен пристап дистрибуиран под условите на Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
Финансирање: Ова истражување нема финансиска поддршка
Конкурентски интереси: Авторите изјавуваат дека немаат конкурентски интереси

Извадок

Вовед: Еритроплакијата и леукоплакијата се заболувања кои спаѓаат во категоријата орални преканцерози. Еритроплакијата има висок ризик за малигна трансформација, а понекогаш лезиите се поврзани со системски заболувања како Plummer-Vinson синдром, хипопластична анемија или ерозивен лихен планус. Клиничката слика варира од бенигни лезии до лезии со висок малигнен потенцијал.

Цел: Целта на предавањето е да ги презентира чекорите кои терапевтот треба да ги преземе во амбулантски услови за навремена и точна дијагностика на оралните преканцерози.

Содржина: Ќе се дискутираат клиничките манифестации на еритроплакија и леукоплакија, вклучувајќи варијации во боја, големина и форма, како и дијагностички постапки кои треба да се спроведат, при што се нагласува значењето на морфологијата и еволуцијата на лезиите.

Резултати и заклучок: Раното препознавање и правилните дијагностички пристапи овозможуваат навремено идентификување на лезиите со потенцијал за малигна трансформација, минимизирајќи ризик за непредвидлив исход.

Oral Precancerous Lesions – Clinical Steps in Ambulatory Settings

Mirjana Popovska[1,2*]

[1]University Dental Clinical Centre "St. Pantelejmon", Skopje, North Macedonia; [2]Faculty of Dental Medicine, MIT University, Skopje, North Macedonia

Edited by: Slavica Hristomanova-Mitkovska
Citation: Popovska M. Oral Precancerous Lesions – Clinical Steps in Ambulatory Settings. Maced Med Electr J. 2025 Nov 20; 5:45-46. https://doi.org/10.3889/mmej.2025.6593
Keywords: erythroplakia, leukoplakia, oral lesions
***Correspondence:** Mirjana Popovska, University Dental Clinical Centre "St. Pantelejmon", Skopje, North Macedonia; Faculty of Dental Medicine, MIT University, Skopje, North Macedonia.
E-mail: popovskam2002@yahoo.com
Received: 01-Oct-2025
Revised: 10-Nov-2025
Accepted: 14-Nov-2025
Copyright: © 2025 Mirjana Popovska.
Citation: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
Funding: This research did not receive any financial support
Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist

Abstract

Introduction: Erythroplakia and leukoplakia are oral lesions classified as precancerous. Erythroplakia carries a high risk of malignant transformation, while these lesions can also be associated with systemic conditions such as Plummer-Vinson syndrome, hypoplastic anemia, or erosive lichen planus. Clinical presentation ranges from benign-appearing lesions to those with significant malignant potential.

Purpose: This lecture aims to present the clinical steps dentists should take in ambulatory settings to enable timely and accurate diagnosis of oral precancerous lesions.

Content: Clinical manifestations of erythroplakia and leukoplakia will be discussed, including variations in color, size, and shape, as well as diagnostic procedures that should be implemented. Emphasis is placed on lesion morphology and evolution to assess malignant potential.

Results and Conclusion: Early recognition and systematic diagnostic approach allow timely identification of lesions with malignant potential, reducing the risk of unpredictable outcomes. Awareness and vigilance in routine dental practice are crucial for patient safety and early intervention.