Научна фондација СПИРОСКИ, Скопје, Република Северна Македонија
Македонско медицинско електронско списание. 2026 Сеп 25; 6:23-24.
https://doi.org/10.3889/mmej.2026.6878
eISSN: 1857-9809
Категорија: *МИТ-ФДМ2026 - „ТРЕНДОВИ ВО ЕНДОДОНЦИЈАТА“*
Секција: *Стоматологија*



OPEN ACCESS

ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ИЗБРАНИ ПРЕКАНЦЕРОЗНИ ЛЕЗИИ ВО ОРАЛНАТА МЕДИЦИНА

Силвана Бара[1*]

[1]Оддел за хирургија, Факултет за дентална медицина, Медицински универзитет, 1005 Тирана, Албанија

Уредено: Славица Христоманова-Митковска
Цитирање: Бара С: ДИЈАГНОЗА И ТРЕТМАН НА ИЗБРАНИ ПРЕКАНЦЕРОЗНИ ЛЕЗИИ ВО ОРАЛНАТА МЕДИЦИНА. Макед Мед Електр С. 2026 Сеп 25; 6:23-24. https://doi.org/10.3889/mmej.2026.6878
Клучни зборови: потенцијално малигни орални нарушувања; орална леукоплакија; еритроплакија; орален лихен планус; биопсија.
***Кореспонденција:** Силвана Бара, Оддел за хирургија, Факултет за дентална медицина, Медицински универзитет, 1005 Тирана, Албанија.
E-mail: silvana.bara@umed.edu.al
Примено: 11-Авг-2026
Ревидирано: 01-Сеп-2026
Прифатено: 20-Сеп -2026
Печатарски права: © 2026 Силвана Бара.
Лиценца: Овој труд е со отворен пристап дистрибуиран под условите на Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
Финансирање: Ова истражување нема финансиска поддршка
Конкурентски интереси: Авторите изјавуваат дека немаат конкурентски интереси

Извадок

ВОВЕД: Потенцијално малигните нарушувања на оралната празнина претставуваат значаен проблем во оралната медицина поради ризикот од нивна прогресија во орален сквамозен карцином. Раното откривање и соодветното лекување се од суштинско значење за намалување на морбидитетот и подобрување на исходот кај пациентите.

ЦЕЛ: Потенцијално малигните нарушувања на оралната празнина претставуваат значаен проблем во оралната медицина поради ризикот од нивна прогресија во орален сквамозен карцином. Раното откривање и соодветното лекување се од суштинско значење за намалување на морбидитетот и подобрување на исходот кај пациентите.

МЕТОДИ: Потенцијално малигните нарушувања на оралната празнина претставуваат значаен проблем во оралната медицина поради ризикот од нивна прогресија во орален сквамозен карцином. Раното откривање и соодветното лекување се од суштинско значење за намалување на морбидитетот и подобрување на исходот кај пациентите.

РЕЗУЛТАТИ: Потенцијално малигните нарушувања на оралната празнина претставуваат значаен проблем во оралната медицина поради ризикот од нивна прогресија во орален сквамозен карцином. Раното откривање и соодветното лекување се од суштинско значење за намалување на морбидитетот и подобрување на исходот кај пациентите.

ЗАКЛУЧОК: Раната дијагноза, навремената интервенција и континуираното следење се клучни за превенција на развојот на орален карцином.

DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SELECTED PRECANCEROUS LESIONS IN ORAL MEDICINE

Silvana Bara [1]*

[1]*Department of Surgery, Faculty of Dental Medicine, University of Medicine, 1005 Tirana, Albania*

Edited by: Slavica Hristomanova-Mitkovska
Citation: Bara S. DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF SELECTED PRECANCEROUS LESIONS IN ORAL MEDICINE. Maced Med Electr J. 2026 Sep 25; 6:23-24. https://doi.org/10.3889/mmej.2025.6878
Keywords: oral potentially malignant disorders; oral leukoplakia; erythroplakia; oral lichen planus; biopsy.
***Correspondence:** Silvana Bara, Department of Surgery, Faculty of Dental Medicine, University of Medicine, 1005 Tirana, Albania.
E-mail: silvana.bara@umed.edu.al
Received: 11-Aug-2026
Revised: 01-Sep-2026
Accepted: 20-Sep-2026
Copyright: © 2026 Silvana Bara.
License: This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY-NC 4.0)
Funding: This research did not receive any financial support
Competing Interests: The authors have declared that no competing interests exist

Abstract

BACKGROUND: Oral potentially malignant disorders represent a significant concern in oral medicine due to their risk of progression to oral squamous cell carcinoma. Early detection and appropriate management are essential for reducing morbidity and improving patient outcomes.

OBJECTIVE: The aim of this review is to summarize the clinical features, diagnostic approaches, and current treatment modalities for selected oral precancerous lesions.

METHODS: A narrative review was conducted focusing on the most common oral potentially malignant disorders, including oral leukoplakia, erythroplakia, oral lichen planus, oral submucous fibrosis, and actinic cheilitis. Particular emphasis was placed on clinical assessment, identification of risk factors, and histopathological confirmation by biopsy.

RESULTS: Biopsy remains the gold standard for assessing malignant potential. Management depends on the type and severity of the lesion and may include elimination of etiological factors, pharmacological therapy, surgical excision, laser treatment, and long-term surveillance. Malignant transformation may occur even after treatment.

CONCLUSION: Early diagnosis, timely intervention, and continuous follow-up are essential for reducing the risk of progression to oral cancer.